

## Q&A

### **Pfizer-Biontech vakcina (Comirnaty)**

Frissítve: 2021. március 1.

#### **Comirnaty vakcina összetétele**

A vakcina a vírus molekuláris szerkezetén alapuló technológia segítségével készült. Az oltóanyag mRNS-alapú, egy lipid nanorészecskébe csomagolt RNS molekulát (mRNS) tartalmaz.

#### **Hogyan véd a vakcina?**

A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a COVID 19 ellen.

#### **Kinél alkalmazható a védőoltás?**

A Comirnaty 16 éves és idősebb személyeknél alkalmazható.

#### **Okoz –e betegséget a vakcina?**

Mivel a Comirnaty nem a vírust tartalmazza az immunitás kiváltásához, így nem okozhat Önnek COVID-19-betegséget.

#### **Hány adag szükséges?**

2 adag. Az oltási protokoll március 1-jei változásával 35 nap különbséggel adják be az első és a második adagot.

#### **Meddig tart a védettség?**

A vakcina által biztosított védelem ideje még nem ismert, meghatározása folyamatban van a jelenleg zajló klinikai vizsgálatok során.

#### **Felcserélhetőség**

A Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina nem cserélhető fel más COVID-19 elleni oltóanyagokkal

#### **Kaphat-e oltást aki átesett COVID 19 betegségen?**

Azon személyek is olthatók a vakcinával, akiknél 3 hónapon túli igazolt SARSCoV-2 fertőzés szerepel

#### **Szükséges-e antigén gyorseszteszt végzése az oltás beadása előtt?**

Az oltás előtt nem szükséges antigén gyorseszteszt.

#### **Kaphat-e oltást, aki krónikus, alapbetegséggel rendelkezik?**

Igen, az oltás krónikus betegséggel rendelkező személyeknek is adható, akiknél nem áll fenn oltásra vonatkozó kontraindikáció

#### **Beadható-e együtt másik védőoltással?**

A Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcinát más oltóanyaggal egyidejűleg nem adható be,

Másik védőoltás legalább 4 hetes időközzel kapható.

## **Várandósság**

Várandósság alatt az oltás nem ajánlott

Várandósság a második oltás után minimum 2 hónappal tervezhető

## **Szoptatás**

Nem ismert, hogy a vakcina kiválasztódik-e a humán anyatejbe.

Akik kockázati csoportba tartoznak és igénylik az oltást a szoptatás ideje alatt is megkaphatják

## **Hogyan történik az oltás?**

A védőoltás beadása oltási terv alapján történik a kijelölt oltópontokon.

Az oltóorvos az oltást megelőzően kérdőív segítségével kikérdezi és megvizsgálja.

Az oltás beadásáról minden esetben az oltóorvos dönt.

## **Az oltás ellenjavallatai**

Akut lázas betegség

A Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció

Az anamnézisben súlyos, kórházi ellátást igénylő gyógyszerrel (pl. penicillin) vagy más védőoltással kapcsolatos anafilaxiás reakció

Várandósság

## **Az oltás után kialakulhatnak mellékhatások (oltási reakciók)?**

Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció. A lehetséges oltási reakciókra az oltóorvos is fel fogja hívni a figyelmet.

## **Milyen mellékhatások (oltási reakciók) várhatóak?**

Oltási reakciók lehetnek: fájdalom és duzzanat a beadás helyén, fáradtságérzés, fejfájás, izomfájdalom, ízületi fájdalom, hidegrázás, láz esetleg bőrpirosodás az injekció beadásának helyén, émelygés.

Nagyon ritkán előfordulhat: megnagyobbodott nyirokcsomók, rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció beadási helyén.

## **Mivel lehet kezelni az oltási reakciót?**

A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer (pl. paracetamol, ibuprofen, metamizol) alkalmazható. Ezek azonban átmeneti reakciók, melyek szövődmények nélkül megszűnnek.

## **Hová lehet jelenteni oltási reakciót?**

Oltási reakciót lehet jelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek.

[https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer\\_mellekhatas](https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer_mellekhatas)

Oltási reakciót a nemzeti Népegészségügyi Központnak is lehet jelenteni.